

UBND THỊ XÃ AYUN PA  
TRUNG TÂM  
DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Số: 18 / HD-TTDVNN

V/v hướng dẫn các giải pháp  
sản xuất và Quản lý Dịch hại tổng  
hợp trên cây trồng trong vụ  
Đông xuân 2022-2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ayun Pa, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- UBND xã, phường;
- HTX Nông nghiệp.

Thực hiện Công văn số 3817/UBND-TH ngày 21/10/2022 của UBND thị xã  
Ayun Pa về việc hướng dẫn sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023 trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các giải pháp sản xuất và Quản lý  
Dịch hại tổng hợp trong vụ Đông xuân 2022-2023 cụ thể như sau:

**1. Đối với cây Lúa thủy lợi:**

- Sau khi thu hoạch vụ Mùa năm 2022: vệ sinh rơm rạ, cày ãi đất, tu sửa, nạo  
vét kênh tưới, tiêu nội đồng, chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón cho sản  
xuất vụ Đông xuân 2022-2023.

- Trong vụ gieo trồng: Bón phân đầy đủ, cân đối, các loại phân; chú ý bón  
lót phân hữu cơ, phân lân trước khi gieo sạ hoặc dùng các loại phân hữu cơ vi sinh  
giúp ruộng lúa phát triển tốt và phòng chống rét ngay từ đầu vụ. Phân chuồng 10  
tấn/ha, phân lân 500 kg/ha. Cụ thể:

+ Bón lót: 10 tấn phân chuồng (hoặc 3 tấn hữu cơ vi sinh) + 500 kg phân lân vǎn  
diễn /ha + vôi 500 kg/ ha, khi trực bừa lân cuối trước khi gieo sạ.

+ Bón thúc đợt 1: Sau khi gieo sạ được 12-15 ngày, bón phân NPK 20:5:5, lượng  
bón 150-200kg/ha.

+ Bón thúc đợt 2: Sau khi gieo sạ được 25-30 ngày, bón phân NPK 25:5:5; lượng  
bón 200 - 250kg/ha.

+ Bón thúc đợt 3: Sau khi gieo sạ 45-50 ngày, bón phân NPK 20:5:10; lượng  
bón 150-200kg/ha.

\* Tuy nhiên tùy theo chân đất có thể bón bổ sung tăng giảm  $\frac{1}{4}$  lượng phân  
trên.

- Thực hiện việc gieo sạ thưa, lượng giống từ 130-150kg/ha, sử dụng các  
loại giống lúa xác nhận, không dùng thóc thịt làm giống.

- Phun thuốc trừ cỏ tiền mầm: sau khi gieo sạ 1- 3 ngày (có thể dùng các loại  
thuốc diệt cỏ Sofit 300EC, Sonic 300 EC, Dibuta 60 EC, Butoxim 60 EC...phun với  
lượng thuốc 1,2 lít/ha, lượng nước phun đảm bảo 200-400 lít nước/ ha phun đều trên mặt

ruộng). Khi cần thiết phun trừ cỏ hậu nảy mầm: (Nominee 10SC,...) khi cây lúa ở giai đoạn từ 7-15 ngày tuổi, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

- Áp dụng việc tưới hợp lý theo nguyên tắc tiết kiệm nước “Nông-Lộ-Phơi” giai đoạn từ gieo sạ đến 15 ngày (giai đoạn mạ) chỉ cần để nước trong ruộng 2cm, từ đẻ nhánh đến chín đỏ đuôi, áp dụng tưới nông, phơi ruộng 3 lần đảm bảo đất có độ ẩm 70-80%, khi chân ruộng nứt chân chim tiến hành tưới nước trở lại hoặc chế độ tưới luân phiên cho những chân ruộng cao, cuối kênh. Tuy nhiên cần đủ nước 5cm trong ruộng ở 3 lần bón thúc phân và lúc lúa trổ.

- Quản lý tốt các đối tượng dịch hại theo “Qui trình quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại IPM, ICM”, “Qui trình 1 phải 5 giảm” phải giống xác nhận, giảm giống, nước (tưới hợp lý, tiết kiệm nước), phân bón (bón phân theo nhu cầu thực tế của cây theo bảng so màu lá lúa), thuốc BVTV (hạn chế và không sử dụng thuốc trừ sâu giai đoạn 40 ngày sau sạ) và giảm thất thoát sau thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

## **2. Trên cây ngô:**

- Trên cơ sở lịch gieo trồng, tiến hành vệ sinh tàn dư thực vật của cây trồng vụ trước, cày ải chuẩn bị giống. Sử dụng giống ngô lai cho năng suất cao, cứng cây, chịu hạn tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn và trung ngày như CP888, CP333, LVN 10, Bioseed 9698, giống ngô nếp HN88, Bạch Long F1,... và một số giống kháng sâu keo mùa thu: NK7328 Bt/GT, NK66 Bt/GT, DK6919S..., phân bón theo diện tích canh tác.

- Đảm bảo đủ nước tưới trong vụ, chú ý giai đoạn ngô phân hóa mầm hoa và nuôi dưỡng quả.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình phát sinh và gây hại của sâu keo mùa thu xử lý theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Khi cần thiết xử lý sâu keo mùa thu có thể sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật như: Voliam targo 063SC, Proclaim 5WG, Bitadin WP, Lufen extra 100EC, 150WG; Match 050 EC; Radiant 60SC; Carno 250SC,...

## **3. Trên cây rau, củ, quả các loại:**

- Trên cơ sở nhu cầu của thị trường bố trí các loại giống đạt năng suất và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Chủ động xây dựng hệ thống tưới nước tiết kiệm, bể chứa nước sạch, cung cấp đủ nước tưới trong các tháng mùa khô.

- Thường xuyên chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây rau, đậu các loại, chú ý ngưng bón thúc các loại phân đậm trước khi thu hoạch 15 – 20 ngày để đảm bảo chất lượng và hạn chế việc dư tồn hàm lượng Nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ) trong các sản phẩm khi thu hoạch; Chú ý sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu đục quả hại đậu xanh; sâu đục thân, trái, bệnh khô vằn; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bệnh thán thư, mốc sương rau đậu các loại; Khi cần thiết sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có nguồn gốc vi sinh để xử lý sâu bệnh và tuân thủ thời gian cách ly theo hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì.

#### **4. Trên cây khoai mì.**

- Thực hiện đúng lịch gieo trồng với cơ cấu các loại giống trên ruộng khoai mì theo chỉ đạo của UBND thị xã và thông báo lịch gieo trồng của phòng Kinh tế.

- Chủ động chọn ruộng khoai mì trồng năm 2022 không bị nhiễm bệnh Khảm lá virus làm giống và một số giống chất lượng cao như KM94, KM95,... để trồng; chăm sóc, bón phân theo dõi tình hình sâu bệnh trên ruộng khoai mì của mình, thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

- Không mua, bán, trồng, trao đổi, vận chuyển các loại giống cây khoai mì không rõ nguồn gốc, giống nhiễm bệnh Khảm lá virus đặc biệt là giống HLS11,... không trồng các loại cây ký chủ trên diện tích cây khoai mì đã nhiễm bệnh Khảm lá virus như cây thuốc lá, cà các loại, ót, bầu, bí đỏ,... ít nhất là một vụ.

- Trong quá trình chăm sóc, kiểm tra sâu bệnh trên ruộng khoai mì, phát hiện có bọ phấn trắng (*mối giới truyền bệnh*) Virus tiến hành đặt bẫy dính màu vàng treo trên ruộng khoai mì để diệt bọ phấn trắng, những diện tích có nguy cơ bùng phát bệnh cần phun thuốc diệt trừ bọ phấn với một trong các loại thuốc trừ rầy có hoặc chất Dinotefuran, Pymetrozine, Acetamiprid như Tenchu pro 350WP,... liều dùng theo hướng dẫn trên bao bì và thực hiện nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; bón phân khi đất đủ ẩm, theo dõi tình hình sâu bệnh trên ruộng khoai mì, thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

#### **5. Trên cây mía.**

- Tập trung thu hoạch theo kế hoạch của Công ty TNHH MTV TTC Gia Lai;

- Sau khi thu hoạch diện tích mía bị bệnh trắng lá không nên lưu gốc mà chuyển sang trồng ngô, mỳ, đậu xanh hoặc bí đỏ phù hợp với từng chân đất tại xã, phường.

- Thực hiện đúng lịch gieo trồng với cơ cấu các loại giống trên ruộng mía theo khuyến cáo của UBND thị xã, phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND xã, phường và của Công ty TNHH MTV TTC Gia Lai.

- Chủ động chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh trên ruộng mía của mình, tự giác thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phòng Kinh tế, UBND xã, phường và Công ty TNHH MTV TTC Gia Lai hướng dẫn.

- Thường xuyên kiểm tra sâu bệnh trên ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh như, bọ trĩ, rầy, rệp sáp hại ở thân, lá mía, đặc biệt rầy môi giới truyền Phytoplasma (*Matsumuratettix hiroglyphicus*) phun thuốc diệt trừ không để lây lan bệnh trên đồng ruộng, có thể phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Vistory 300EC; Bassa 50EC; Trebon 10EC theo liều lượng, khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

- Khi phát hiện ruộng mía bị nhiễm nhẹ bệnh trắng lá tỷ lệ bệnh, (TLB) <30% và mức độ trung bình (từ 30-60%): tiến hành cuốc tiêu hủy cây (*bụi*) mía bị bệnh và rắc vôi bột vào hố những cây (*bụi*) mía bị bệnh để hạn chế lây lan; đồng thời, chăm sóc, bón phân can đới, giúp cây phát triển tốt, vượt ngưỡng gây hại của

bệnh. Đối với những diện tích mía bị nhiễm nặng TLB >60% tiến hành cày tiêu hủy, sau đó luân canh 1-2 năm với các cây trồng khác trước khi trồng lại mía.

- Đối với những diện tích đã nhiễm bệnh tại xã ChuBăh, IaSao cần sát trùng dụng cụ khi thu hoạch bằng cồn, vôi 0,5% để diệt Phytoplasma không cho lây lan sang diện tích mía chưa nhiễm bệnh, không lấy hom giống để trồng mới và không nên để mía lưu gốc.

- Phát quang cỏ dại xung quanh ruộng mía, cho vườn mía thông thoáng, hạn chế chuột và một số dịch hại khác lưu trú tích lũy gây hại.

- Làm các đường băng để chống cháy trong mùa khô.

## 6. Trên cây điều:

- Sử dụng một số giống chủ lực như: PN1, AB29, AB0508,... trong kế hoạch trồng tái canh, ghép cải tạo vườn điều già cỗi, năng suất thấp.

- Vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, tỉa cành, tạo tán, thu gom cành, lá, hoa, quả bị bệnh đem tiêu hủy, tạo cho vườn điều thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít muỗi, nguồn bệnh lây lan.

- Trong vụ khi thời tiết mưa, đất đú ẩm, tiến hành bón phân đầy đủ, cân đối, bổ sung một số phân vi lượng cho cây bằng cách phun qua lá vào giai đoạn trước khi cây ra nụ, để giúp cây tăng cường sức chống chịu với bệnh, tăng cường sự phân hóa mầm hoa, để có nhiều nụ hoa hơn, là điều kiện để tăng năng suất và chất lượng, vào thời kỳ cây điều ra đợt non, chồi hoa và quả non.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch hại trên cây điều, chú ý bọ xít muỗi, bệnh than thư,... Khi cần thiết dùng thuốc trừ bọ xít muỗi (Decis 2.5EC, Cyperan 10 EC); Bệnh than thư: sử dụng một trong loại thuốc có hoạt chất như: *Copper Hydroxide*, *Cuprous Oxide*, *Copper Oxychloride + Kasugamycin*, *Hexaconazole*. Liều lượng và nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

## 7. Trên cây ăn quả:

- Sau mỗi đợt thu hoạch tiến hành vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, tỉa cành, chăm sóc bón phân đầy đủ và cân đối.

- Đảm bảo đủ nước tưới trong các tháng mùa khô, kết hợp tǔ gốc; những trang trại trồng cam, na cần thiết kế và xây dựng hệ thống tưới nước.

- Trong quá trình chăm sóc, kiểm tra một số sâu bệnh: sâu đục trái, bọ trĩ, nhện đỏ, ruồi đục quả, phấn trắng, bệnh than thư,... Khi cần thiết sử dụng một trong các loại thuốc BTVT có nguồn gốc vi sinh để xử lý sâu bệnh và tuân thủ thời gian cách ly theo hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp kính gửi UBND xã, phường, HTX Nông nghiệp; phối hợp, tổ chức, thực hiện./. *Ký*

### Noi nhận:

- Nhu trê;
- Thường trực Thị ủy, (b/c);
- UBND thị xã (b/c);
- Phòng Kinh tế, (p/h);
- Lưu VT.

